



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ВИДОВЖЕННЯ КОРОНКИ ЗУБА

Протягом першої доби:

- прикладай холод на зону втручання по 15 хвилин кожні 2 години;
- не вживай гарячу їжу та напої;
- якщо відчуватимеш біль чи дискомфорт — телефонуй в клініку.

Для запобігання інфікування та полегшення післяопераційних симптомів приймай медичні препарати за призначеною лікарем схемою.

Використовуй ополіскувач, який призначив лікар після кожного вживання їжі та перед сном.

Важливо: НЕ полоскати, а тримати розчин в ротовій порожнині, аби не зашкодити зону втручання.

До третьої доби:

- намагайся не жувати на бік, у ділянці якого проведено втручання;
- вживай м'яку їжу;
- уникай паління та вживання алкоголю;
- уникай фізичних навантажень / занять спортом;
- не приймай гарячу ванну / не відвідуй сауну.

Після операції ти можеш відчувати дискомфорт, незначний біль, припухлість, незначні виділення крові в ділянці втручання. Також може відчуватись обмеженість у рухах нижньою щелепою. Можливе незначне зменшення чутливості губи, щоки, язика, оскільки втручання проводили близько до нерву. Ці симптоми є нормальними після операції та можуть тривати від 2 днів до 2 тижнів, поступово зникаючи. Якщо ти відчуваєш, що біль та припухлість посилюються, важко відкрити рот, обов'язково звертайся в клініку.

Важлива особлива ретельна гігієна порожнини рота — чищення зубів тричі на день після прийому їжі (крім зубів, що прилягають до зони втручання) до зняття швів. Використовуй м'яку зубну щітку — таку можна придбати у клініці на рецепції. Не використовуй флоси та зубочистки у ділянці хірургічного втручання.

На сьому добу: зазвичай зняття швів.

Після зняття швів: деякі шви можуть бути прихованими через набряк м'яких тканин. У такому випадку просимо через два-три дні після зняття швів ретельно оглянути зону втручання та у разі потреби зателефонувати у клініку.

Нагадуємо: для збереження здоров'я зубів відвідуй стоматолога щопівроку.

ДОТРИМАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЛІКАРЯ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ:

- є обов'язковим етапом стоматологічного втручання. Невиконання рекомендацій може не тільки збільшити реабілітаційний період, а і спричинити ускладнення;
- а також забезпечує, у разі необхідності, подальше гарантійне лікування!

Дані рекомендації є типовими. Скориговані рекомендації з індивідуальними призначеннями медикаментів лікар надає за потреби після візиту.