



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ

Протягом 2 годин:

не вживай їжу, поки не пройде анестезія.

Протягом першої доби:

- прикладай холод на зону втручання по 15 хвилин кожні 2 години;
- не вживай гарячу їжу;
- якщо відчуватимеш біль чи дискомфорт – телефонуй у клініку;
- намагайся не жувати на бік, у ділянці якого проведено втручання;
- вживай м'яку їжу;
- уникай паління та вживання алкоголю;
- уникай фізичних навантажень, занять спортом.

Для запобігання інфікуванню та полегшення післяопераційних симптомів приймай медичні препарати за призначеною лікарем схемою.

Використовуй призначений лікарем ополіскувач після кожного вживання їжі та перед сном.

Важливо: НЕ полоскати а тримати розчин в ротовій порожнині, аби не зашкодити зону втручання. Інтенсивне полоскання може призвести до передчасного розходження швів!

Після операції ти можеш відчувати дискомфорт, незначний біль, припухлість, незначні виділення крові в ділянці втручання, а також деяку обмеженість у рухах нижньою щелепою. Можливе незначне зменшення чутливості губи, щоки, язика, оскільки втручання проводили близько до нерву. Ці симптоми є нормальними після операції та можуть тривати від 2 днів до 2 тижнів, поступово зникаючи. Якщо відчуватимеш, що біль та припухлість посилюються, важко відрити рот, обов'язково звертайся у клініку.

Важлива особливо ретельна гігієна ротової порожнини: чищення зубів тричі на день / після кожного прийому їжі (крім зубів, що прилягають до зони втручання, до зняття швів).

Використовуй м'яку зубну щітку – таку можна придбати у клініці на рецепції. Не використовуй флоси та зубочистки у ділянці хірургічного втручання.

На сьому добу: зазвичай зняття швів.

Після зняття швів: деякі шви можуть бути прихованими через набряк м'яких тканин. У такому випадку просимо через два-три дні після зняття швів ретельно оглянути зону втручання та у разі потреби зателефонувати у клініку.

Нагадуємо: для збереження здоров'я зубів відвідай стоматолога щопівроку.

ДОТРИМАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЛІКАРЯ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ:

- є обов'язковим етапом стоматологічного втручання. Невиконання рекомендацій може не тільки збільшити реабілітаційний період, а і спричинити ускладнення;
- а також забезпечує, у разі необхідності, подальше гарантійне лікування!

Дані рекомендації є типовими. Скориговані рекомендації з індивідуальними призначеннями медикаментів лікар надає за потреби після візиту.